

Etapa 1: Diagnosticul Parkinsonismului

Bradykinezia și cel puțin una dintre următoarele:

- Rigiditate musculară
- 4-6 Hz tremor în repaus
- Instabilitate posturală care nu este cauzată de disfuncție proprioceptivă principală vizuală vestibulară, cerebelară

Etapa 2: Caracteristici care tind să excludă boala Parkinson drept cauză a Parkinsonismului

- Istoric cu atacuri repetate și cu evoluție treptată a caracteristicilor de Parkinson
- Istoric cu repetate loviri la cap
- Istoric cu encefalită
- Tratament neuroleptic la primele simptome
- >1 rude afectate
- Remisie susținută
- Caracteristici strict unilaterale după 3 ani
- Paralizie supranucleară a vederii
- Semne cerebelare
- Afectare autonomică severă timpurie
- Demență timpurie gravă cu tulburări de memorie, limbaj și praxis
- Semne Babinski
- Prezența unei tumori cerebrale sau hidrocefalus comunicant la examenul tomografic
- Rasuns negativ la doze mari de levodopa (dacă este exclusă malabsorbția)  
Expunere MPTP

Etapa 3: Caracteristici care conduc la diagnosticarea bolii Parkinson (sunt necesare trei sau mai multe pentru diagnosticarea definitivă a bolii Parkinson)

- Debut unilateral
- Prezența tremurului în repaus
- Tulburare progresivă
- Asimetrie persistentă care afectează în special zona de debut
- Răspuns excelent la levodopa (70-100%)
- Coree severă indusă de levodopa
- Răspuns Levodopa timp de  $\geq 5$  ani
- Curs clinic timp de  $\geq 10$  ani

Tabel 1: Societatea din Marea Britanie pentru Boala Parkinson – criteriile de diagnosticare a bolii Parkinson