



Tabel 2a: Criterii de diagnosticare a bolii Parkinson (Gelb et al, 1999) sprijinite de Consiliul Consultativ al Institutului Național pentru Tulburări Neurologice și Atacuri Vasculare Cerebrale, SUA Institutul Național de Sănătate.

Criterii pentru un POSIBIL diagnostic de boală Parkinson
Sunt prezente cel puțin 2 din cele 4 caracteristici din grupul A; cel puțin unul dintre acestea este tremorul sau bradykinezia (vezi Tabel 2b) și fie: <ul style="list-style-type: none"> • nici una din caracteristicile din grupul B nu este prezentă <ul style="list-style-type: none"> • sau simptomele au fost prezente mai puțin de trei ani și nici una dintre caracteristicile de la grupul B nu este prezentă (vezi Tabelul 2b) sau: <ul style="list-style-type: none"> • s-a demonstrat existența unui răspuns relevant și susținut la levodopa sau la un agonist de dopamină • sau pacientului nu i s-a administrat în mod adecvat levodopa sau un agonist de dopamină
Criterii pentru un diagnostic PROBABIL de boală Parkinson
Sunt prezente cel puțin trei din cele patru caracteristici din grupul A (vezi Tabel 2b) Și nu sunt prezente nici una din caracteristicile din grupul B (notă: este nevoie de o durată a simptomelor de cel puțin trei ani pentru a îndeplini această cerință) (vezi Tabel 2b) și s-a demonstrat existența unui răspuns relevant și susținut la levodopa sau la un agonist de dopamină
Criterii pentru un diagnostic CERT de boală Parkinson
Sunt îndeplinite toate criteriile pentru un diagnostic POSIBIL de boală Parkinson Și se obține o confirmare histopatologică la autopsie (vezi Tabel 2c)

